

1765
A(0418)

食前又は食後に！

新内外胃腸薬「錠剤」

特徴

新内外胃腸薬「錠剤」は食前又は食後に服用していただける、ウルソデオキシコール酸配合の胃腸薬です。

食前に服用すると...

胃もたれや胃痛等といった不快症状を緩和し弱った胃の調子を整えてくれます。

食後に服用すると...

消化に時間のかかる脂肪の消化を助け、胃酸をすばやく中和し胸やけや胃もたれ、腹部のぼり等を緩和します。また、食べ過ぎ飲み過ぎ等にも効果的です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■ 効能・効果

胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ（胃もたれ）、胃重、胸つかえ、げっぷ（おくび）、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲み過ぎ（過飲）、胃痛、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

■ 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	
8歳以上11歳未満	1・1/2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 1錠を分割した残りを使用する場合には、清潔な紙につつま外箱の中に保管し、2日以内に使用してください。
- (4) 錠剤の取り出し方。

〈PTPシートの取り出し図〉

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



■ 成分・分量 1日量（9錠）中

合成ヒドロタルサイト	1,000 mg	ショウキョウ末	100 mg
炭酸水素ナトリウム	450 mg	ウイキョウ末	100 mg
ケイヒ末	300 mg	ウルソデオキシコール酸	60 mg

添加物として、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、l-メントール、ステアリン酸Mg、その他3成分を含有します。

〈成分に関連する注意〉

生薬（薬用の草根木皮等）を用いた製剤ですから、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 配置期限の過ぎた製品は服用しないでください。

