

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように保管してください。

## 頭痛・歯痛・生理痛・神経痛に

第2類医薬品

# ケロリン

解熱鎮痛薬

(非ピリン系)

**ケロリン**はアセチルサリチル酸を主成分とし、頭痛・歯痛・生理痛・神経痛などの痛みや発熱に優れた効果を発揮する解熱鎮痛薬です。

- 〈特徴〉 ●アセチルサリチル酸・無水カフェインが互いに働きあい、頭痛・歯痛・生理痛・発熱などをすみやかに和らげます。  
●のみやすい生薬(ケイヒ)配合の粉末剤で、早く溶けて優れた効果を発揮します。  
●眠くなる成分は入っていません。コンパクトな分包サイズで学校・会社・車の運転・外出先での服用にも便利です。



## 使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

- 次の人は服用しないでください
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
  - 15才未満の小児。
  - 出産予定日12週以内の妊婦。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください

相談すること



- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 高齢者。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の診断を受けた人。  
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症 状   |
|-------|---|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ、青あざができる                                 |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血                |
| 精神神経系 | めまい   |
| その他   | 鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中<br>の痛み、過度の体温低下 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状   |
|--------------------|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、<br>のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

| 症状の名称   | 症 状   |
|---|---|
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。              |
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                 |
| ぜんそく  | 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。                                 |
| 再生不良性貧血                                       | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。 |

3. 5～6回服用しても症状がよくなるない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〈効能・効果〉 ●頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。  
●悪寒・発熱時の解熱。

〈用法・用量〉 次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は6時間以上おいてください。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 15才以上(大人) | 1包      | 2回     |
| 15才未満     | 服用しないこと |        |

〈用法・用量に関連する注意〉

本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。

〈成分・分量〉 1包(800mg中)

アセチルサリチル酸..... 600mg


無水カフェイン..... 60mg

ケイヒ末..... 60mg

添加物としてパレイシヨデンブンを含有

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10

☎ 076(421)5531 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

富山めぐみ製薬株式会社

富山県富山市三番町3-10